

PANASZ- ÉS TÜNETMENTES LAKOSSÁG SZÁMÁRA 14 ÉVES KORTÓL AJÁNLOTT SZŰRŐVIZSGÁLATOK								
AJÁNLOTT SZŰRŐVIZSGÁLAT 51/1997. (XII.18.) NM rendelet alapján	VIZSGÁLAT ELEMELI	érintett korcsoport / vizsgálat gyakorisága					MEGJEGYZÉS	
		14-18 év	21 év	21-40 év	40-64 év	65 év felett		
SPECIÁLIS GYERMEKKORI SZŰRŐVIZSGÁLATOK	testi fejlettség, nemi érés, mozgásszervek, golyva, tanulás, hangulati élet vizsgálata	2 évente	iskolaorvos, gyermek- vagy felnőtt családorvos is végezheti					
SZÍV-ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT FELMÉRÉSE	anamnézis felvétele, szervi szövődmények, társbetegségek	2 évente	FELNÖTT ALAPSZÁLTUSZ	kis szív-érrendszeri kockázat esetén 5 évente		2 évente	ezen vizsgálatok elvégzése minden praxisba újonnan bejelentkező páciens számára előírt	
CSALÁDI ANAMNÉZIS	hypertonia, ISZB, AMI, stroke, daganat, érbetegség, egyéb	2 évente		közepes és nagy szív-érrendszeri kockázat esetén 2 évente				
ÉLETMÓDBELI RIZIKÓ	alkohol, dohányzás, táplálkozás, testmozgás, fogamzásgátló	2 évente		közepes és nagy szív-érrendszeri kockázat esetén 2 évente				
FIZIKÁLIS VIZSGÁLAT	RR, TT, TM, BMI, (mellkaskörf.) (szsz. EKG, LABOR)	2 évente		közepes és nagy szív-érrendszeri kockázat esetén 2 évente				
METABOLIKUS BETEGSÉG	haskőfogat, TG, HDLC (TC, LDLC), ÉVC (ppVC, OGTT)	2 évente		közepes és nagy szív-érrendszeri kockázat esetén 2 évente				
ATEROSCLEROSIS VIZSGÁLATA	erek tapintása, hallgatózás, ér-Doppler, boka-kar index (ABI)	-		nagy kockázatú személyeknél 2 évente				
VESEKÁROSODÁS VIZSGÁLATA	seKreatinin, Kreatinin-clearance, GFR, vizeletvizsgálat	-		nagy kockázatú személyeknél 2 évente				
ÉRZÉKSZERVEK VIZSGÁLATA	látás-, színlátás-, hallásvizsgálat, sügött beszéd megértése	2 évente		-		évente		
AJAK- ÉS SZÁJÜREGI DAGANATOK SZŰRÉSE	ajak- és szájüregi szervek áttekintése	-		2 évente				
TÜDŐDAGANAT, TBC ÉS COPD* SZŰRÉSE	ernyőképszűrés (40 év felett + dohányzás=kérdőív+spirometria)*	-	2 évente	2 évente	évente*	évente*	rizikócsoporthoz korábban is indokolt	
GYOMOR-BÉLRENDSZERI DAGANATOK SZŰRÉSE	széklet rejtett vérzés vizsgálata	-	-	-	50-70 év között évente		rizikócsoporthoz korábban is indokolt	
PROSZTATARÁK SZŰRÉSE	urológiai tapintásos vizsgálat, vérvétel (PSA)	-	-	-	50-70 év között évente		rizikócsoporthoz korábban is indokolt	
EMLŐRÁK SZŰRÉSE	emlő önvizsgálata oktatása	minden orvos-páciens találkozás alkalmával					*mensest követő 7-10 napon ajánlott	
	emlő tapintásos vizsgálata	minden egészségügyi kockázat felmérés alkalmával*						
	MAMMOGRÁFIA (emlő-lágyrész rtg vizsgálata)		-	-	-	45-65 év között 2 évente		rizikócsoporthoz korábban is indokolt
MÉHNYAKRÁK SZŰRÉSE	nőgyógyászati vizsgálat, cytologia, kolposzkópia	-	-		25-65 év között 3 évente		rizikócsoporthoz korábban és gyakrabban is indokolt	
CSONTRITKULÁS VIZSGÁLATA	DEXA (csontsűrűség-vizsgálata), labor (vizelet, vér)	-	-	-	50 év felett, ill. menopausa		rizikócsoporthoz férfiaknál is indokolt	